



Van kuiken tot kip

Scholenproject

Ouders uitkiezen

- Selecteren van ouder dieren
 - Zorgen dat ouders geen erfelijke gekte hebben
 - Gezonde dieren selecteren
 - Zorgen dat dieren elkaar aanvullen
- Eieren rapen
 - Na 1 week na samenstellen
 - Eieren bij ongeveer 12 °C bewaren
 - Eieren elke dag keren



Broeden

- Broedmachine

- Voordelen:

- Elk moment starten met broeden
 - Kan veel meer eieren uitbroeden dan onder een kip
 - Kan de eieren goed in de gaten houden



- Broedse kip

- Voordelen:

- Is veel leuker
 - De kip past op de eieren en later op de kuikens
 - De kip doet al het werk



De kuikens zijn uit het ei en nu???

- Warmte (warmte lamp of moeder kloek)
- Water
 - In ondiepe waterbak
- Voer (pas na 1 of 2 dagen)
 - Ondiepe voerbak



Voer

- Eerste zes weken kuikenmeel
- 6-12 weken kuikenkorrel
- Vanaf 12 weken jonge hennen of korrel
- Na 5 - 6 maanden legkorrel



De eerste 6 weken

- Kuikens kunnen nog niet zonder warmte
 - Moeten bij de moeder blijven of
 - Moeten onder warmtelamp en/of warmteplaat blijven
- Kuikens krijgen steeds meer veren



6 – 12 weken

- Kuikens kunnen onder warmtelamp weg
- Kuikens mogen naar buiten
- Kuikens moeten geringd worden rond 6 – 8 weken
- Verschil zichtbaar tussen haantjes en hennetjes



12 weken en verder

- Haantjes en hennetjes scheiden
- Haantjes zijn met zekerheid te herkennen door sierveren
- Dieren voor shows selecteren



Selecteren van jonge dieren

- Let op uitsluit fouten zoals:
 - Kam
 - Verkeerde pootstand
 - Krom borstbeen



Vragen????

